

Krūtinės ir pilvo aortos aneurizmų, disekacijų stentavimas

Krūtinės, pilvo aortos aneurizmos ir disekacijos (kraujagyslės sienelės atsisluoksniavimas) yra vienos pavojingiausių kraujagyslinių patologijų. Niekas neįtarantiems pacientams besiplečianti aortos aneurizma kartais vadinama „tyliuoju žudiku“. Laiku diagnozavus šią patologiją tinkamai parinktiems pacientams ją galima gydyti endovaskuliniu būdu – implantuoti dengtą metalinį vamzdelį (stentgraftą) ir taip atitverti besiplečiančios aneurizmos spindį nuo aukšto slėgio kraujo tėkmės ir sumažinti aneurizmos plyšimo riziką. Jei niekas neįtariančiam pacientui nediagnozuota, negydyta aneurizma visgi plyšta, esant tiksliai ir savalaikiškai diagnostikai, palankioms klinikinėms aplinkybėms, galima plyšusios aneurizmos „maišą“ izoliuoti ir pridengti jau minėtu stentgraftu taip sustabdant masyvų kraujavimą ir sumažinant mirties riziką.

Aortos disekacija tai vidinis stambios kraujagyslės sienelės atsisluoksniavimas, dažnai sutrikdantis vidaus organų, galūnių ar net smegenų kraujotaką. Laiku diagnozavus šią patologiją tinkamai parinktiems pacientams galima atstatyti kraujo tėkmės vientisumą ir sušvelninti disekacijos padarinius.